

Daylong actinica

SPIRIG

Dispositif médical

Composition

Composants: bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, ethylhexyl triazone, isoamyl p-methoxycinnamate, ethylhexyl methoxycinnamate, methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol, butyl methoxydibenzoylmethane.

Excipients: propylparaben, methylparaben, excip. ad solutionem.

Forme galénique et quantité de principe actif par unité

Flacon de 100 g de lotion.

Flacon doseur de 80 g de lotion: 1 pression contient 0,5 g de lotion.

Indications/Possibilités d'emploi

Prévention de différentes formes de cancer de la peau non mélanome chez les patients à risque (immunodéprimés) et des photodermatoses.

Posologie/Mode d'emploi

Chaque matin, avant la première exposition au soleil, Daylong actinica doit être appliqué généreusement et réparti uniformément sur les zones de peau découvertes. L'application est à renouveler selon les recommandations posologiques après un contact prolongé avec de l'eau ou lors de forte transpiration.

Daylong actinica doit être appliqué avant l'utilisation de produits cosmétiques; il faut d'abord faire pénétrer la lotion dans la peau pendant quelques minutes.

Flacon doseur

Comme la surface cutanée à traiter varie, le tableau suivant fournit des indications sur la quantité de produit nécessaire:

Visage (y compris oreilles et nez): au moins 2 pressions.

Cuir chevelu et nuque: au moins 1 pression.

Avant-bras: au moins 2 pressions.

Dos de la main: au moins 1 pression.

Pour assurer une répartition optimale de la lotion, il est par exemple possible d'étaler une première pression de lotion sur le visage puis une seconde pression au bout de 5 à 10 minutes. Il faut cependant veiller à ce que pas plus de 10 à 15 minutes ne s'écoulent entre la première et la seconde application.

Les doses indiquées pour le visage ou le cuir chevelu peuvent servir de base pour établir la dose nécessaire à d'autres parties cutanées.

Il faut au début exercer plusieurs pressions sur le flacon doseur pour libérer de la lotion. Les premières pressions ne délivrent pas encore une dose complète. Tenir si possible le flacon doseur verticalement et pomper lentement pour obtenir une dose complète.

Contre-indications

Hypersensibilité à l'un des composants/excipients selon la composition.

Mises en garde et précautions

Bien que Daylong actinica offre une protection maximale pendant plusieurs heures, la peau ne doit pas être exposée au soleil de manière excessive.

Les patients à risque, dont le système immunitaire est affaibli, devraient généralement porter des vêtements protecteurs et éviter une exposition directe aux rayons du soleil.

Daylong actinica peut causer une sensation de brûlure lors de contact direct avec les yeux. Si la lotion entre en contact avec les yeux, rincer abondamment et soigneusement avec de l'eau. Lors de l'application de la lotion, il faut éviter les yeux. Les yeux sont à protéger par des lunettes de soleil hautement protectrices.

Il faut arrêter l'utilisation de Daylong actinica en cas d'apparition d'irritations cutanées, d'éruptions cutanées et de réactions semblables à des coups de soleil.

Interactions

Si Daylong actinica est utilisé avec des produits anti-moustiques, la lotion doit être appliquée en premier. Il faut ensuite attendre environ 15 minutes avant l'application du produit anti-moustiques. Il faut être attentif au fait que, dans ce cas, l'effet protecteur de Daylong actinica peut être diminué.

Grossesse/Allaitement

On ne dispose d'aucune information relative à une utilisation lors de la grossesse.

Effet sur l'aptitude à la conduite et l'utilisation de machines

Non pertinent.

Effets indésirables

Système immunitaire

Réactions allergiques.

Peau

Irritations, rougeurs, prurit, réactions semblables à des coups de soleil.

***Surdosage***

Aucun cas de surdosage n'a été rapporté.

Propriétés/Effets

Daylong actinica est un dispositif médical de classe I.

Daylong actinica a été testé pendant deux ans dans une étude portant sur la prévention du cancer de la peau non mélanome chez des patients immunodéprimés à risque (patients ayant eu une transplantation d'organe) et a démontré son efficacité dans la prévention de la kératose actinique et du carcinome épidermoïde.

Une autre étude réalisée chez des patients atteints de lécithine polymorphe a également démontré l'efficacité de Daylong actinica dans la prévention de ces lésions cutanées.

Daylong actinica est un produit de protection solaire de la catégorie «très haut niveau de protection contre les rayons UV» et contient des filtres photostables à large spectre contre les rayons UVA et UVB dans une lotion hydratante. La peau exposée à la chaleur et aux rayons UV se dessèche de manière importante. La perte d'humidité est compensée par l'application de produits hydratants et peu gras.

Daylong actinica hydrate la peau. La lotion convient aussi aux peaux sensibles car elle est exempte de parfum et d'émulsifiants PEG conventionnels.

Pharmacocinétique

Non pertinent.

Données précliniques

Aucune donnée spécifique au produit et pertinente pour l'utilisation n'est disponible.

Remarques particulières

Les filtres solaires contenus dans Daylong actinica peuvent provoquer une coloration des vêtements, des fibres synthétiques et d'autres matériaux (par exemple liners pour piscines).

Il est donc recommandé de ne pas appliquer Daylong actinica juste avant de s'habiller.

Titulaire de l'autorisation

Spirig Pharma SA, 4622 Egerkingen.

Fabricant

Spirig Pharma SA, 4622 Egerkingen.

Mise à jour de l'information

Janvier 2009.

Cette spécialité ne dispose pas d'une information professionnelle approuvée par les autorités. Ce texte est une information-produit fournie par la firme ou rédigée par Documed SA à partir de l'information destinée aux patients. Sa publication a été officiellement accordée à la société Documed SA. © Copyright 2009 by Documed SA. Toute utilisation et reproduction sans autorisation est illicite.